

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書

重校宋竇太師瘡瘍經驗全書卷之五

宋燕山竇漢卿輯著

明三衢大酉堂繡梓

目錄凡二十五症

肩疽鼠疽圖說方三 三串毒圖說 脾癰圖說

左搭肩發圖 右搭肩發圖說方四 左右串圖說

兩肩兩脇癰疽發圖說 血潰流注疽圖說方三

癰發圖說 癰瘡圖說方三 委中毒圖說方二

臀疽圖說方二 腿遊風圖說方三 腎癰圖說方三

陰蝕瘡圖說

方十七

女陰蝕瘡圖說

方廿一

左右便毒圖說

方二

小腸流注圖說

方三

穿襠發圖說

方四

冷漏濕毒流注圖說

方三

紫疥瘡圖說

方四

坐馬癰圖說

方三

貼骨疽圖說

方一

附骨癰圖說

見上

第五卷目錄畢

訂校宋寶太師瘡瘍經驗全書卷之五

圖論方

上有疽下鼠疽



此毒因怒氣上攻于心酒後房事下傷于腎宜服加味

裏散

桔梗 厚朴 白芷 人參 黃芪 當歸 官桂

川芎 荊芥 黃芩 烏藥 防風 連翹 香附

枳殼 天花粉 右水煎服

胸膈滿悶加陳皮砂仁 熱盛加小柴胡黃芩玄參

咳嗽加麥冬塊苓五味杏仁桑皮

口乾煩燥加麥冬前胡乾葛烏梅

寒多加厚朴防風藿香再服黃芩九通氣散仍貼玄

武膏金系膏

如膿出盡時服內補散三四貼

膿未盡時服排膿內托散

小便赤澀用五苓散加黃連燈心服之
其毒從小便出

更服乳香護心散日進五服 又服黃九丸日進
開胃散 治發背寒氣入胃不欲飲食

砂仁

枳殼

陳皮

茯苓

肉桂

甘草

藿香


厚朴

右水煎服

仍用神異膏貼之


三串毒

日本古本



此症上下生之其形雖一而中間皮好但內肉潰爛不
起紅色亦不大痛日漸潰爛此症之來六氣七情所感
嚴寒酷暑所遇積毒于臟腑或年老男婦性愛怡然而
亦患此者想平居坐卧湿地而然也若無外症得生若
飲食日減泄瀉發熱勢難生矣治法與發背諸證同

腎命怒發及脾瘕




此証下腎俞雙發因飲熱酒行房怒氣傷肝受濕而得也陽發于外可治痰發陰發傷于腎膜膿稀者為虛難治若老少婦人性氣溫和飲食謹節又無六情惱懷而亦患此者乃受地之濕氣或暑月以冷水沐浴而然脾瘡發于左臍之間初發可用艾火灸之急服追疔湯汗之即散治法服藥同前蠟丸甚宜服之


左搭肩發

玉相堂精選玉卷

五



左慈有發



此症少陽經少血有相火尤甚于厥陰發于左搭肩骨
上生者以動之處入可治難安串于右搭肩者必難治
也此症由于風變之來以脉斷之邪在表其症大小便
如故飲食如常口能知味知其不在裏也不惡風只燥
熱脉不浮知不在表若表裏既和則邪在經絡中凝于
經絡其滯斯出身半已上風從受之故云八風之變法
當却寒邪調和經絡中氣血則氣血通暢自愈

參藥

鷄黃皮 煨血竭

花蕊石 米片

右為細末濕用乾摻乾用清油調搽

加味麻黃桂枝湯 形實色黑背生紅腫胛骨下痛脉

浮數而洪藥食則嘔

生附子一錢瓜蒌仁一錢五錢羌活一錢甘草節六分人參一錢

青皮一錢黃芪二錢半夏六分白朮一錢山藥一錢

水二鍾姜三片煎服 冬天加黃柏

牛膠飲 截癰疽惡瘡險處服之使毒氣不攻于內不

傳惡症

牛皮膠透明好者四兩淨 右用好酒一碗入膠內重湯煮

令膠溶透者亦用酒煎米湯調和服之

白芷升麻湯

白芷一錢升麻五分桔梗五分甘草一兩黃芩二錢


酒炒

生地一兩黃芪連翹各二錢生黃連一錢五分

紅花一錢歸稍二錢官桂三分當歸一錢

右十三味水酒各一碗煎至半碗服之酒膳并怡養心神不可妄想以動心火


左右串



此症發于左搭肩骨上生在以動之處可治難安串于
右搭肩必難治矣可用鷄黃皮及綿絮焙乾為末濕則
乾搽乾則清油調搽

如症發于右搭肩骨上生在移動之處可治難安串于
左搭肩者亦難治之用藥搽搽依前左搭肩藥治之
另有良方在前左串右串二形圖后附方治之

兩肩兩脇瘡疽發



凡兩肩下兩脇邊成瘰癧因血虛而氣亦虛切不可服
補陽之藥熱劑即補陽也倘受熱劑則虛熱愈盛易致
傷骨膜切慎切慎宜服十六味流氣飲內疎黃連湯治
法與發背瘰癧同

湯劑附子薄桂烏頭之類禁用

血潰流注疔




此症多生膏梁形重之人有此疾者好食煎炒炙燂糖
蜜之類其疽大者如鷄彈形像猶如紫李只腫不紅內
串經絡之間流注骨節之內遍身痠疼百節疼痛用內
托散加木瓜 白芍 連翹

再服乳香護心散 黃凡九

外用圍藥敷之不可遲也

凡用藥以意消息切勿執方對症夫子曰疾固也

癰發



此証屬陰多生骨骼之間初生如梅子大在于皮肉之間內不疼不痒無力之人二十日始作紅腫有力人一月方作紅腫內先潰爛皮面上紫黑色破後口不能收時常作痛出臭膿水必成其漏則難治矣急服排膿托裏散

排膿內補散

人參內補散

人參膏

五香連翹湯

蠟丸丸

護心散

更用猪蹄湯頻洗之

未潰之先用鉄箍散敷之能

消其一半

癰瘡



大抵下部之症以蒼朮為主佐以黃柏之辛行以青皮

加以甘草隨症用引經之劑則得効矣此毒受在肝腎
經痛不可忍用內托流氣飲治之

蒼朮

黃柏

青皮

甘草

芍藥

當歸

白朮

檳榔

川芎

羌活

獨活

白芷

木瓜

牛膝

杜仲

冬加薄桂夏加黃芩

姜三片煎服

內托清氣飲

人參

茯苓

白朮

官桂

陳皮

木瓜

紫蘇

枳殼

甘草

芍藥

當歸

蒼朮

羌活

獨活

川芎

白芷

姜三片棗一枚煎服

再服紫蘇流氣飲

三香和氣飲

紫蘇用
藥通用
腰痠風及婦人癰瘡

委中毒



此毒受在腎經寒氣阻滯而加減紫蘇流氣飲治之
先用敗毒流氣飲

先服敗毒流氣飲紫蘇 厚朴 枳殼 桔梗 陳皮

烏藥 白芍 白芷 香附 檳榔 木香 木瓜

牛膝 杜仲 防風 甘草 姜三棗一煎服

後服紫蘇流氣飲

紫蘇 厚朴 甘草 香附 烏藥 檳榔 杜仲

木瓜 枳殼 桔梗 川芎 防風 當歸

姜三棗一空心服 排膿加人參黃芪

癰疽



此癰受在腎經而腎屬少陽後此陰中之陰道遠位僻藥力所難及者須預補之腎因受虛寒濕毒結聚成風故生此症也常用上下助癰藥治之 敗毒流氣飲
內托流氣飲 內托羗活湯

羗活

官桂

酒洗

大黃

酒洗各四分

黃芪

一錢五分

藥本

連翹

歸稍

鐵各一

炙草

陳皮

蒼朮

各五分

白芷

右作一服水酒各一鍾煎空心熱服以被覆

患上使藥力行之方能奏功如或不愈用鉄箍散姜汁醋火上熬熱調敷留孔時令熱餘汁潤之以助藥力

肥遊風



此癘受小腸腎經傷于寒熱邪氣毒流于腿此是遊毒也當用紫蘇流氣飲治之后服敗毒流氣飲

紫蘇流氣飲

紫蘇 枳殼 厚朴 甘草 香附 烏藥 獨活

白芷 荊芥 蒼朮 黃柏 陳皮 木瓜 枳殼

川芎 防風 姜三棗一煎服

敗毒流氣飲

紫蘇 桔梗 枳殼 枳櫚 陳皮 羌活 防風

荊芥 木瓜 桂枝 黃柏 獨活 烏藥 甘草

香附 山梔仁 熱服

先用金絲膏貼四五日以拔其毒水後用搽藥治之
搽藥

輕粉 二錢

黃連末

錢三

孩兒茶

錢一

黃柏末

錢一

白芷末

錢一

荊芥末

錢一

雞內黃

錢一

冰片

二分

枯凡

二錢

韶粉

三錢

右和勻為細末先用溫苦茶洗淨再用紙搥乾
乾搽 滋水

陰囊毒 即外腎瘻



此症因肝經濕熱不利遂流毒于膀胱經感冒寒暑

邪氣偏腎于陰之經絡以至血氣凝聚寒濕不散陰氣
上腫而痛或潰爛皮脫腎子眩暈宜用瀉肝清熱湯服
之

龍胆草

酒拌炒

當歸稍

車前子

少澤瀉

生地

芍藥

黃連

黃柏

知母

木通

淡竹葉

防風

各一

甘草稍

五分

右作一剂水二碗煎八分食前服

外用鉄箍散圍之

此症腐壞急用烏金散敷之

烏金散

麩不拘多少煨存性 紫蘇葉 俱為末香油調搽乾

疹亦可

○或潰爛飲食少思日晡發熱急服加味小柴胡湯

小柴胡 人參 黃芩 川芎 白朮

黃芪 當歸 甘草 黃栢 知母各一錢

半夏五分 白芍五分 右水煎服

痛甚加黃連 小便不利加木通車前子

口渴加天花粉麥冬五味

腎瘻



縮腎於此及調水
左灸左右灸

此毒年高者因宿有疝氣疾及感冒寒濕氣辛勤少壯
為因房事所得初起陰囊赤腫身發寒熱攻小注婦來
二穴痛不可忍用手按之皮寬不急可用敗毒散加入
當歸須 川棟子發散 用手按之急脹似火之熱急
用陰囊毒之藥治之

更服黃九丸

倘或開刀須待其熟以油頭繩扎住腎子以小刀開海
底穴其膿血即流盡矣外貼金絲等膏少勞戒色并避
湯火風氣及諸毒物

陰飪瘡



此陰蝕瘡之生也皆由臟中虛怯腎氣衰少風邪入腑
毒惡損傷榮衛或與有毒婦人交接不曾洗淨故時痛
時痒以漸成竅作疳膿水湧流若不早治命亦難保先
用蛇床子地骨皮桑槐枝煎湯溫洗內服清熱消疳鮮
毒湯外用搽藥先用金絲膏後用紫金膏按出毒水易
能長肉

慘藥

輕粉二錢 孩兒茶二錢 紅絨灰一錢五分 疳丹一錢
米片三分 真珠五分 麝香二分 雞內金一錢 石炭一錢

芦甘石煨一錢

夫陰蝕瘡者即下疳也陰汗燥臭故莖根生疳瘡此處乃肝經所屬之分野

清濕瀉肝湯

升麻 羌活 柴胡 知母 黃柏 生甘草

澤瀉 青皮 川芎 生地 蒼朮 龍胆草

木通 水煎 熱加黃芩 小便不利加車前子

虛加人參

又方 氣弱無力莖根下生瘡膿水不止

人參 黃芪 當歸 柴胡 升麻 草梢 黃栢
知母 胆草 紅花 白芍 黃芩 甘草稍能緩莖
中痛故用之
又方補中益氣湯加南星蒼朮黃栢知母黃芩牛膝灯
草

防風羌活散 治下疳

防風 羌活 荊芥 獨活 黃芪 牛旁子
山梔 甘草 木通 蒼朮 車前子 天花粉
洗方

冬青葉 四五十 甘草 黃栢 防風 煎湯洗之

下疳摻藥

輕者用輕粉末一味摻上

又方

孩兒茶 輕粉

黃柏

冰片

橄欖核錢辰

為末乾摻

蛀疳

輕粉

韶粉

各等分為末摻之

外蛀捍肉蛀捍

冰片二分 輕粉六分 射香五分 為細末摻孔內

三才圖會卷三
三
內外疔瘡并小便一切疔疾

蒼朮二錢 黃柏二錢 秦艽一錢 滑石二錢 水煎服
如小便澀滯疼痛加甘草節蒲黃

又方

黃芪 白蒺藜 羌活 白附子 各二錢

末之用猪腰子一付竹刀切破入藥在內線扎定白
酒煮熟空心服之

內外疔瘡身熱小便澀滯宜服小柴胡湯加龍胆草黃
連車前子

下疳搽藥

青橄欖

燒灰一錢

孩兒茶

一錢

冰片

三分

為細末

先用杏仁

四分

皮

又加輕粉

四分

和研如泥先敷

患上一日米泔洗之后用前搽藥

又方

紅棗去核嵌明凡二分珍珠四粒煨過存性末之

疼痛不可忍

黑羊角穿山甲煨過研末各二錢乳香沒藥各一錢

空心酒下

薰法

葶藶一升煮極爛茶葉五錢研末乘熱傾在多年馬
桶內在無風處薰之待出一身汗妙甚男婦並用
小便疳瘡大爛者

面粉一兩 黃蠟八錢 白蠟一兩 冰片一錢

先用麻油三兩火上熬化二蠟隨下面粉次下冰片
為隔紙膏貼之五日后痛即止肉即生矣

陰蝕瘡



婦人之性多偏而多鬱若有不遂則心肝胃三經之火

勃然而起遂致陰内生瘡其種不一或生陰蝕瘡或生
陰茄或生陰蕈或生疳瘡或生翻花瘡或生蠹瘡極痛
極痒狀如虫行淋瀝膿汁等症皆由濕熱與心火相擊
而生惟陰茄難治性氣和緩之婦胸次坦夷服藥易愈
若性急悍妬之婦習與性成服藥百帖方愈必須忌口
絕慾戔性為要當以補心養胃與茯苓補心湯內補托
裏流氣欽間服之其陰中腫塊如棗核者名陰茄匾如
簞者名陰算陰中極痒者名蝕瘡名蠹瘡餘類倣此
茯苓補心湯

白朮 乾葛 前胡 桔梗 甘草 陳皮 白芍
紫蘇 人參 半夏 當歸 熟地 川芎 枳殼
姜三片 棗肉二枚 灯心 甘草 薑水二鍾煎服
補心養胃湯

陳皮 半夏 茯苓 甘草 台朮 黃連 當歸
川芎 生地 青皮 白芍 檳榔 烏藥 遠志
滑石 山梔 仁車前子 玄胡索

內補托裏流氣飲

甘草 節 茯苓 澤瀉 猪苓 紫蘇 山梔 黃連

台木

當歸

川芎

生地

白芍

人參

黃芪

木通

紫蘇

青皮

香附

苦參

澤瀉

白蘞

冰黃膏

用黃連二兩水二碗文武火煎至一碗瀝去渣并重
湯慢火煎至一酒杯加水片三分射香二分輕粉五
分疏黃末一錢俱研末調和用鵝毛潤陰內立効
一抹散

黃連末

鹿角灰

各一錢

紅絨灰

七錢

鷄內金灰

一錢

一錢

孩兒茶

七錢

珍珠末

五錢

冰片

五分

輕粉

五分

射香

三分

右為細末乾摻患處

洗方

芭蕉根搗爛煎湯溫洗避風

又方

川椒

五錢

蛇床子

半斤

三錢

茺柳枝

各七枝

艾

一兩

文

一兩

苦參

一兩

米泔

五六碗

煎滾去

直乘

熱薰洗之

入方

治陰蝕瘡

蠱瘡

雄黃

一錢

硫黃

五分

麝仁

五粒

木鱉子

一枚

去殼

剉

艾五錢入前藥在內作條放在馬桶薰之其虫即死

麻黃湯 陰腫或瘡或爛

麻黃 黃連 蛇床子 各五錢 艾 三錢 烏梅 三大戟

防風 白朮 右剉煎湯薰洗再用孩兒茶一錢輕粉冰片杏仁灰各五分為末摻之

陰中極痒及蝕鬚瘡

用大蒜搗碎煎湯洗之后以杏仁不拘燒烟盡研末經綿包納陰戶

又方取雞肝或牛肝猪肝煮熟乘熱醋入陰戶其虫入肝內

又方水銀輕粉雄黃和棗肉研細無星納陰戶
又方以鯽魚胆搽之

陰疳用茄根燒灰末之香油調勻搽毛潤內
陰中堅痛

白凡五錢 生大黃 生甘草 各二錢五分 為末綿包
如棗核大入陰中

陰中生瘡 黃芩湯 當歸 黃芩 川芎 大黃

白凡各二錢 黃連三錢 右剉水五碗煎薰洗洗付雄黃

硫黃輕粉末

陰爛

孩兒茶 鷄內金各二錢 輕粉 五分 冰片三分 為細末乾摻

陰瘡 與男子妬精瘡畧同

黃丹 枯凡 扁蓄 藁本各二兩 硫黃五錢 蛇脫一條 為末

末搽之如不乾息再用芍藥末摻之


或隱處疼痛鹽三合炒熱青皮包熨之立止

陰冷母丁香十粒 研末縫紗袋如指大入菜內納陰戶

小便濕痛牛膝五兩 酒二升煮半升去粗作三服亦治血

結痛無故血尿龍骨一兩研末熱酒調下一匙

左右便毒



夫便毒者生于小腹兩腿合縫之間或行路遠涉辛苦

或上或下低閃胸氣或房事所傷或男女大慾不得直
遂其志故敗精滯血留聚中途或夢寐之間而不泄或
妄想不能忘情思念故結成毒然腎者作強之官伎巧
所出一有所感精血凝滯此症遂生初起之時寒熱交
作兩腿牽絆腫起不能屈伸乃症之漸也急服龍胆湯

龍胆草一錢 木鱉三枚 大黃三錢 瓜蒌一枚 桃仁 紅花 歸須各等分

水酒各一碗煎八分去渣夜露一宿早空心溫服行利十餘次

荆防敗毒散 穿山甲 甘草 紅花 羌活 當歸 川芎 赤芍

生地 金銀花 防風 木通 枳殼 烏藥 天花粉各錢 槐花錢半 犀角五錢

小腸流注



此症受在心經伏熱結聚成毒也當用敗毒流氣飲再服清心流氣飲治之

敗毒流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

香附

防風 川芎

羌活

獨活

白芷

白芍

檳榔

茴香 澤瀉

玄胡索

姜三棗一煎空心服

清心流氣飲

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

麥冬

青皮 防風

柴胡

羌活

赤芍

香附

生地

川芎 紫蘇

甘草

姜三棗一煎服

小便不利加車前子滑石木通

時服蠟丸丸

穿襠發一名癰癰一名橫痃



此毒因辛苦得之生于窮骨穴上若不速治毒潰傷于
谷道內爛臟腑即死急服蠲毒散

蠲毒飲

甘草 貝母 赤芍 當歸 白芷 金銀花

青皮 木通 連翹 枳仁 龍胆草 天花粉 各錢

穿山甲 炮如元氣欲泄加酒蒸大黃三四錢煎服飲
酒隨量以助藥力行煎十餘次其毒無膿血後大便
中出

又方 欲作未作之時服之立消

牙皂七片灰火煨黃色去皮陰地上去火毒為末

代刀散

穿山甲

僵蚕

枳殼

姜黃

牽牛

赤石脂

大黃

白芷

貝母各等分

為細末每服五錢早晨空心用酒調下行利十餘次
用薄粥補之其膿血從大便中出

灸初起便毒臟毒法

用濕蚯蚓糞捻成餅如銅錢厚放患處以艾火在餅
上灸之奄熱一二十壯為度或痛或痒即可
后服蠲毒散

冷漏濕毒流注

五和堂米道三老

三



此毒或因足牽爪破有傷火風氣或因寒濕流注於足脛生瘡形如牛眼四畔紫色黑色常出臭血水先用三稜針刺週迴血出盡然後金絲膏貼之呼出毒水腐肉然後將紫金膏貼看瘡已紅活再令隔紙膏貼之方具後

面粉三升 輕粉一升 白蠟一錢 黃連末一錢 黃栢一錢

血丹升過為細末清油燭調和攤隔紙膏貼之


又方 摻藥 黃連末二錢 輕粉二錢 冰片二錢 血竭一錢

孩兒茶一升 不為極細末乾摻

紫芥瘡

五桂堂精選五卷

三二



此症五臟六腑之積毒其氣蒸肺而肺主皮毛故發于
經絡相傳頭面皮膚手足形如紫疥或疹或痒遍生不
拘何處項中黑陷久則嘔逆沉重神思恍惚速治之方
保無虞

清肌解毒湯

升麻	乾葛	粉草	防風	荊芥	連翹	薄荷
白芷	山梔	白朮	蒼朮	黃連	苦參	花粉
桔梗	羌活	胡麻	青皮	胆草	當歸	川芎
生地	赤芍	天仙	白蒺藜			

虛加入參煮酒加白花蛇蟬脫黃芩肉桂天麻馬鞭草
等味以意消息之宜服苦參丸
煎湯洗法

荊芥 薄荷 苦參 白芷 蒼朮 柏樹枝

獨活 桑枝 柳枝 槐枝 鳳仙梗 金銀藤

用水不拘煎湯去粗在無風處薰洗之拭乾用搽藥
搽藥

杏仁去一兩皮 風子肉一兩二味另研如泥 輕粉真者五錢 川椒末三錢

硫黃末二錢 荊芥末一錢 防風末一錢 白芷末一錢 樟冰二錢

枯丸 二錢

右名另末和白雄猪胆汁加生桐油調勻搽入肌肉
不見藥為効

清肌燥濕解毒湯

蒼朮

白朮

防風

荆芥穗

胡麻子

白蔞

苦參

減半

當歸

白芍

羌活

薄荷

白芷


川芎

石菖蒲

甘草

右十五味各等分磨末水和為丸每服二錢百沸湯
送下

坐馬癰



此毒癰受在腎經虛毒氣熱毒傷于內六腸之經並聚
成毒發為癰瘡此乃毒症先用宣毒湯次用敗毒流氣散

宜毒湯

白芷

赤芍

甘草

五分

大黃

三錢

當歸稍錢連翹

枳殼錢

水酒各一鍾煎一滾去查早辰空心服

又方紫蘇

人參

桔梗

枳殼

甘草

柴胡

川芎

羌活

白芷

防風

白朮

芍藥

金銀花

姜三棗一煎服

後用內托追毒飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

桔梗

枳殼

金銀花

黃連

烏藥

當歸

芍藥

白芷

防風

附骨疽論

夫貼骨癰者即附骨癰也皆附骨貼肉而生字雖殊而病則一此症之發盛暑身熱賊風入于骨節與熱相搏復遇冷濕所折或居勞太過兩足下水或坐卧濕地身體虛弱而受寒邪然風熱伏結壅遏附骨成疽着大骨節間其急者身不得轉動按之愿骨痛經曰便充皮肉生急洪洪如臍狀其緩者一點酸疼漸充長大行步艱澁以致骨肉不相續者失治令身成膿不潰至死身變青黯但痛按之至骨久則結腫或結瘰癧其附骨疽久

而即腫結膿以此為異其治附骨疽作賊風中之則病
深膿多九偏枯牽曲之生乃附骨疽之漸也四肢因寒
乍寒乍熱小便赤大便澀無汗須用紫蘇斬艾鳳仙草
煎湯熱熨之使腠理開然後以布拭乾再用乾被覆之燒
乳香薰之如虛甚隨服人參膏略加附子以助其氣復
以艾火攻之萬無不愈者

贈言通

玉村堂集卷五

三五



此症用筋頭按患處極痛是穴以墨點定艾灸百壯為期忽爾艾壯爆起不拘壯數乃其驗也不必灸矣獨活寄生湯加人參二錢一服

附骨疽瘰之症其毒入于骨髓所犯甚深外膚若好而貼骨之肉已先內潰骨肉已不相連日輕夜重煎寒發熱至百日常有膿方可用火針刺之不若初起之際艾灸百壯方可保命若待其出膿百人之中能生幾何急服蠟丸丸


久雨陰濕倍加蒼朮 白朮 澤瀉 防風 木瓜

附骨瘰 治法同前



校正宋寶太師施湯經驗一書卷之五

臍毒症



臍毒者其大腸盡處是臍頭一曰肛門又曰屎孔內是也毒者其勢兇也皆喜怒不測飲食不節陰陽不調臍腑不和或房勞太過或飲醢房之酒或食五辛炙燔等

味畜毒在內流積為瘰疔門腫痛大便堅硬則株痛其
傍生小者如貫珠大者如李核剪寒作熱疼痛難安勢
感腫脹翻凸虎浮早治易愈失治潰膿孔爛陷內寸許
者難生血膿出而腫消痛減者易生也

一初起微腫即用濕紙蚓糞捻成餅如錢厚放患上文
壯如半粒豆大者燒之微熱即去再換餅燒之再易如
前法以十四壯為期外用米香散搽之

爐甘石

大銀二錢

黃連膏之得乾乳末所用

乳香

一錢另研

石膏

二錢另研

水片

五分

射香

一分

和研細末田螺搗爛取汁調

塗患上偶無田螺煎黃連汁亦可

先服什藥一劑追其毒

歸尾系

生甘草二錢

白芷一錢

黃連二錢

枳殼

檳榔

烏藥

赤芍藥錢生地

天花粉一

皂角刺

莢仁泥二錢

紅花各五

大黃系

穿山甲焙

玄明粉系水二鍾浸一宿明早煎至一滾空心服之

行利六七次用薄粥補之若補早腹反痛

清臟內托散

人參

黃芪

當歸

川芎

陳皮

甘草

黃連

生地

赤芍

白朮

黃芩

獨活

枳殼

白芷

防風

牡丹皮

槐花

升麻

烏藥

水二鍾廣膠五錢煎服倘寒熱脾胃餘症以意增減
全在隨症活法